




## Recomanacions per a les cures del malalt a l'alta Reservori Subcutani per a Infusió (PORT – A – CATH)

Li han col·locat un Port-A-Cath o reservori subcutani, que és un aparell que es posa sota de la pell, per a poder administrar líquids continus, en tractaments llargs de medicació com quimioteràpia, hemoteràpia, nutricions i altres.



Aquest implant, permetrà tenir accés a les venes, punxant directament sobre el dispositiu, per administrar-li la medicació o per treure-li sang.

**Les cures** que ha de tenir, mentre dugui el reservori són:

- \* Pot dutxar-se cada dia, però mentre porti els punts de la ferida, procuri no mullar-se'ls. En cas de que se li mullin:
  1. Renti's les mans amb aigua i sabó i retiri la gasa amb compte.
  2. Desinfecti la ferida amb povidona iodada (en trobarà a les farmàcies) i tapi-la amb gases estèrils.
- \* Pot fer l'activitat normal habitual, sense cap precaució especial.
- \* Pot nedar, si el metge li permet.
- \* Dugui juntament amb la seva documentació, alguna targeta que identifiqui el tipus de Port-A-Cath que porta, per si fos necessari fer alguna consulta.
- \* Perquè no s'obturi, s'ha d'heparinitzar (injectar heparina) cada quatre setmanes, més o menys. Amb això s'assegura la permeabilitat del dispositiu, quan s'utilitza de manera intermitent. Per aquest motiu li donaran visita a l'Hospital.

**Contacti amb el seu metge si:**

- \* Nota mobilitat, rotació o desplaçament de l'aparell en palpar-lo en la zona que està inserit.
- \* Observa l'aparició d'hematoma (bossa de sang sota de la pell), envermelliment inflamació o augment de sensibilitat local.
- \* Febre de 37'5° o més.