



Data d'emissió: Març 2006  
Actualizació Gener 2007  
Actualizació Juny 2007  
Gener 2008

## CIRURGIA ELECTIVA DE COLON

### PREPARACIÓ DE COLON

#### HEMICOLECTOMIA DRETA

- No preparació

#### HEMICOLECTOMIA EZQUERRA I SIGMOÏDECTOMIA

- No preparació de colon
- Enema de neteja 1000 cc (Gener) 2008)

#### NEOPLÀSIA DE RECTE (preparació sempre)

- **Polietilenglicol (BOHM)**
  - 17 hores: 16 sobres a passar en 4 hores, valorar deposició i repetir fins que sorti 0/1
- **Fosfosoda:**
  - 17 hores: 2 flascons (3000 d'aigua) a administrar en 4 hores, valorar deposició i repetir fins que sorti 0 / 1
  - Sueroteràpia: glucosolí 1000cc amb 80 mEq ClK a passar en 18 hores
  - Ionograma 1 hora després d'acabar la preparació
- **Enemas** de neteja

#### DIETA (tots els pacients)

- **Nutrició Enteral: 1000 cc**
- **Aigua:** dieta hidrica abundant (quantificar) fins les 2 hores matinada (intervenció al matí) o fins a les 9 hores (intervenció a la tarda)



## PROFILAXIS ANTIBIOTICA

Profilaxi antibiòtica oral: dia abans de la intervenció a les 19 i 23 h (solo neoplàsia de recte)

- Neomicina 1 g
- Metronidazol 1 g

Profilaxi antibiòtica parenteral: EV

- Metronidazol 1 g
- Gentamicina 240 mg

S'administrarà al baixar el pacient a quiròfan

### **Profilaxi antibiòtica en cirurgia urgent colorrectal:**

Profilaxi antibiòtica parenteral: EV

- Metronidazol 1 g
- Gentamicina 240 mg

S'administrarà al baixar el pacient a quiròfan