

INSTRUCCIONS DE L'ÚS DE BCNU TÒPICA A LA MICOSI FUNGOIDE

(10 mg/ 100 g. ó 20 mg./100 g.)

- La pomada s'ha d'aplicar amb guants rebutjables o guants de làtex. Si s'utilitzen guants rebutjables els guants utilitzats s'han de tirar en una bossa de paper. Quan la bossa de paper estigui plena s'ha de segellar amb cinta adhesiva i s'ha de tirar a les escombraries. Si s'utilitzen guants no rebutjables s'han de rentar intensament amb aigua i sabó després de cada aplicació.
- La pomada s'ha de aplicar una vegada al dia a totes les zones afectades, amb un discret massatge.
- Netejar la pomada a les 6-8 hores amb aigua i sabó. Evitar el contacte directe amb la pell d'altres persones quan la pomada estigui a sobre de la zona tractada.
- Guardar la pomada a la nevera tancada hermèticament.
- Pot emportar-se la pomada als viatges,. Guardar-la en una zona freda si és possible. Si la té alguns dies a temperatura ambient, afecta poc l' estabilitat de la pomada. Si la pomada es torna fosca (marró) tirar-la.
- Deixar d'aplicar la pomada a qualsevol zona de la pell que es torni vermella, irritada o dolorosa. Aplicar una crema amb corticoesteroides, compreses o banys per alleugerar els mencionats símptomes.

INSTRUCCIONES DEL USO DE BCNU TÓPICA EN LA MICOSIS FUNGOIDE

(10 mg/ 100 g. ó 20 mg./100 g.)

- La pomada debe ser aplicada con guantes desechables o guantes de látex. Si se usan guantes desechables, los guantes usados deben tirarse en una bolsa de papel. Cuando la bolsa de papel esté llena debe sellarse con cinta adhesiva y ser tirado a la basura. Si se usan guantes no desechables deben ser lavados intensamente con agua y jabón tras cada aplicación.
- La pomada debe aplicarse una vez al día en todas las zonas afectadas, realizándose un discreto masaje.
- Limpiar la pomada a las 6-8 horas con agua y jabón. Evitar contacto directo con la piel de otras personas mientras la pomada se halle sobre la zona tratada.
- Guardar la pomada en la nevera cerrada herméticamente.
- Puede llevarse la pomada en los viajes. Guardarla en una zona fría a ser posible. El tenerla algunos días a temperatura ambiente afecta poco la estabilidad de la pomada. Si la pomada se vuelve oscura (marrón) tirarla.
- Dejar de aplicar la pomada en cualquier zona de la piel que se vuelva roja, irritada o dolorosa. Aplica una crema con corticoesteroides, compresas o baños para aliviar dichos síntomas.