



Data d' emissió: Març 2006

Data de revisió: Gener 2007

## SERVEI DE FARMÀCIA VIA CLÍNICA CIRURGIA COLO-RECTAL

### Dia d'ingrés: -1

- Profilaxi antibiòtica vo:
  - Metronidazol 1 g : 19, i 23h.
  - Neomicina 1g : 19 i 23h.
- Bemiparina 2500 unitats 20h
- Diazepam 5mg vo a les 2h
- Pantoprazole 40mg vo 20h
- Medicació habitual (full adjunt) fins a les 7h
- Preparació de colon ó no (full adjunt)
- Nutrició enteral sense fibra 1000 cc

### Dia 0

#### INTERVENCIÓ MATÍ:

- Profilaxi antibiòtica ev: administrar 30 minuts abans d'anar a quiròfan
  - Metronidazol 1g 7h
  - Gentamicina 240 mg 7h
- Medicació habitual a les 7h (full adjunt)
- Diazepam 5mg a les 7h

#### INTERVENCIÓ TARDA:

- Profilaxi antibiòtica ev: administrar 30 minuts abans d'anar a quiròfan
  - Metronidazol 1g 14h
  - Gentamicina 240 mg 14h
- Medicació habitual a les 9h (full adjunt)
- Diazepam 5mg a les 9h



## INTERVENCIÓ

### Postoperatori:

INTERVENCIÓ MATÍ: a partir de les 15h:

- Protocol analgèsia postoperatoria **1a**
  - Catèter epidural: 2-6 ml segons ordres mèdiques
  - Paracetamol 1g/6h ev
  - Dexketoprofeno 50mg/8h màxim 48h
  - *Rescat:* Meperidina 1mg/kg sc
- Glucosalí 2000cc + 60 mEq ClK /24h
- Pantoprazole 40 mg
- Ansiolític SOS
- Medicació habitual

INTERVENCIÓ TARDA: a partir de les 18h:

- Protocol analgèsia postoperatoria **1a**
  - Catèter epidural: 2-6 ml segons ordres mèdiques
  - Paracetamol 1g/6h ev
  - Dexketoprofeno 50mg/8h màxim 48h
  - *Rescat:* Meperidina 1mg/kg sc
- Glucosalí 2000cc + 60 mEq ClK /24h
- Pantoprazole 40 mg
- Ansiolític SOS
- Medicació habitual

### Dia 1:

- Protocol analgèsia postoperatoria **1a**
  - Catèter epidural: 2-6 ml segons ordres mèdiques
  - Paracetamol 1g/6h ev
  - Dexketoprofeno 50mg/8h màxim 48h
  - *Rescat:* Meperidina 1mg/kg sc
- Glucosalí 2000cc + 60 mEq ClK /24h
- Bemiparina 2500 unitats
- Pantoprazole 40 mg
- Ansiolític SOS
- Medicació habitual

Si tolera dieta i es retiren sèrums i es manté la analgèsia EV y/o epidural



### **Dia 2:**

- Protocol analgèsia postoperatòria 2
  - Paracetamol 1g/6h ev
  - Metamizol 2g/6h ev
  - *Rescat:* Meperidina 1mg/kg sc
- Glucosalí 2000cc + 60 mEq ClK /24h
- Bemiparina 2500 unitats
- Pantoprazole 40 mg
- Ansiolític SOS
- Medicació habitual

Si tolera dieta i es retiren sèrums i es manté analgesia EV

### **Dia 3:**

- Protocol analgèsia postoperatòria 2
  - Paracetamol 1g/6h ev
  - Metamizol 2g/6h ev
  - *Rescat:* Meperidina 1mg/kg sc
- Glucosalí 2000cc + 60 mEq ClK /24h
- Bemiparina 2500 unitats
- Pantoprazole 40 mg
- Ansiolític SOS
- Medicació habitual

Si tolera dieta i es retiren sèrums, administrar medicació oral:

- Paracetamol 1g/6h vo
- Pantoprazole 40mg vo
- Bemiparina 2500 unitats
- Ansiolític SOS
- Medicació habitual

### **Dia 4:**

Si tolera dieta continuar amb la medicació oral fins a l'alta. Si no, perllongar la pauta endovenosa segons ordres.